

大腸内視鏡検査説明

さっぽろ白石内科消化器クリニック

様

検査日 年 月 日 () 来院時間 時

※予約変更の際は必ずご連絡ください。

検査2～3日前

- ・ 繊維の多い食品、消化に悪い食品は避けてください。
きのこ類、種のある果物（イチゴ、キウイ、スイカなど）、海藻類（昆布、わかめ、ひじきなど）、繊維の多い野菜（かぼちゃ、ほうれん草、セロリ、とうもろこしなど）、ピーナッツ、こんにゃく、ごまなど。

検査前日

- ・ 夕食はできるだけ消化に良いものを 20時までに済ませてください。それ以降は検査終了まで絶食です。水分は摂ってもかまいません。
- ・ 20時に下剤 センノシド2錠、ピコスルファートナトリウム1本（コップ一杯くらいの水に入れて）お飲みください。

検査当日

- ・ 朝食はとらないでください。水、お茶は飲んでもかまいません。
- ・ ネット予約された方は、検査予約時間の30分前までにご来院ください。
- ・ 自宅で下剤を服用される方： _____ 時より下剤を内服してください。（別紙参照）
- ・ 朝の薬は起床後、服用してかまいません。
- ・ 糖尿病で服用している方やインスリンをしている方は検査終了まで中止してください。
- ・ 薬品名 _____ 月 _____ 日から中止
- ・ 検査着に着替えますので更衣しやすい服装でおこし下さい。
- ・ 鎮静剤を使用した場合、基本的に当日はお車、自転車の運転はできません。
- ・ 検査前に眼鏡、義歯、時計などの貴金属類ははずしていただきます。
マニキュア、つけ爪をしている方ははずしてきてください。
- ・ 検査前に感染症と血小板数の検査をします。感染症検査は医療者に血液曝露による感染があった場合に必要な情報で、血小板数検査は組織採取の前に出血傾向がないことを確認するために必要な検査です。ご了承下さい。

検査方法

- ・ 検査前に大腸の動きをおさえるため鎮痙薬（ブスコパン・グルカゴン）を静脈注射または筋肉注射します。
- ・ 検査が楽に受けられるように鎮静剤を使用します。
- ・ 病変が見つかった場合には、病変部の組織を採取（生検）し病理組織検査をします。
- ・ 鎮静剤を使用された方は、回復室で休んでいただいた後、診察室で検査結果を説明いたします。

ポリープの切除について

- ・ 検査中にポリープが見つかった場合、ポリープを切除することも可能です。
ポリープを切除した場合、出血の可能性があるため1週間程度は激しい運動、アルコール摂取は控えて下さい。